

Om kapselendoskopi

Information om din undersøgelse



Kapselendoskopi er en undersøgelse af tyndtarmen. Den bliver udført ved hjælp af en kapsel, som du skal synke med et glas vand. Kapslen er på størrelse med en stor tablet og indeholder et ganske lille kamera (se foto af kapslen ovenfor).

Forberedelser

Hvis du tager jerntabletter, skal du holde pause med dem i 7 dage før undersøgelsen.

Hvis du har diabetes og er i tvivl, om du må følge forberedelserne til undersøgelsen, skal du kontakte personalet i Gastroenterologisk Ambulatorium.

Dagen før undersøgelsen:

- Fra frokost må du kun indtage klare væsker, som vand, saft, kaffe uden mælk, te, sodavand, juice uden frugtkød, klar suppe eller bouillon uden fyld.
- Efter kl. 22.00 må du ikke spise, men kun drikke vand.

På undersøgelsesdagen:

- Du må ikke tage din morgenmedicin.
- Har du behov for smertestillende medicin, kan du tage dem med vand senest kl. 06.30.
- Du må drikke et glas vand om morgenen.
- Din bluse eller skjorte skal være af tynd bomuld, og den skal være lang nok til, at den kan nå ned omkring hofterne.

Aflever udstyret hos os dagen efter

Vær opmærksom på, at du skal sørge for at aflevere udstyret sammen sted dagen efter – enten selv eller med hjælp fra en pårørende.

Vi bruger udstyret dagligt, og det er vigtigt at vi får det retur, så det kan blive downloadet og klar til næste patient.

Selve undersøgelsen

Du får påsat et mavebælte, der er forbundet til en lille computer, som du bærer i en lille skuldertaske. Du skal synke kapslen med vand, som er opblandet med 4 breve Movicol, som er et afføringsmiddel. Det er med til at udrense tyndtarmen yderligere, så vi bedre kan se din tyndtarm. Vi tilbyder dig også en kapsel kaldet Imogas mod den oppustethed, som Movicol kan give.

Der bliver optaget en videofilm af tarmens indre overflade. Optagelsen bliver cirka 10 timer lang. En blå kontrollampe på computeren blinker to gange i sekundet, så længe der optages video.

Hvis de regelmæssige blink fra kontrollampen stopper før der er gået 6 timer, skal du kontakte Gastroenterologisk Ambulatorium. Pas på den lille

Medicinsk Afdeling

computer. Den må ikke blive udsat for stød eller slag. Du kan ellers foretage dig almindelige daglige aktiviteter under undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Når den blå lampe på computeren ikke længere blinker (efter cirka 10 timer), er undersøgelsen slut, og du må forsigtigt tage bæltet og skuldertasken af.

Kapslen forlader kroppen med afføringen. Dagen efter undersøgelsen skal du aflevere udstyret i Gastroenterologisk Ambulatorium inden middag eller efter aftale.

Svaret på undersøgelsen er klar inden 3 uger, og det bliver sendt til den læge, der har henvist dig til undersøgelsen.

I meget sjældne tilfælde kan kapslen sætte sig fast i tarmen. Hvis du får stærke mavesmerter, skal du henvende dig til Gastroenterologisk Ambulatorium fra kl. 8-15. Efter kl. 15 skal du ringe til lægevagten (70 11 07 07) og forklare omstændighederne. Du vil så blive henvist til Skadestuen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan vi træffes på 79 40 63 45 (tryk 3).

Kontakt

Medicinsk Afdeling
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Gastroenterologisk Ambulatorium
79 49 63 45 (hverdage kl. 8-15)
