

Organkirurgi

Navlebrok hos børn

Et navlebrok er en åbning eller en svaghed i bindevævet ved navlen. Navlebrokket ses som en bule på maven. Normalt er det ufarligt, og hos de fleste børn forsvinder navlebrokket af sig selv. I nogle tilfælde anbefaler vi operation.

Om navlebrok

Hos op mod 20 procent af alle nyfødte sker der ikke en naturlig lukning af hullet i navlen, hvor navlestrengen har siddet. Det betyder, at der kan opstå et navlebrok, som er en åbning eller en svaghed i bindevævet ved navlen. Risikoen for navlebrok er højere, jo tidligere dit barn er født.

Når dit barn er i ro, ses navlebrokket normalt ikke, men så snart dit barn er aktivt, græder eller har afføring, buler navlebrokket ud. Nogle børn har et meget stort brok, hvor der kan være tarme i.

Operation

Normalt er navlebrok ufarligt, og hos de fleste børn forsvinder brokket af sig selv med alderen. Hvis brokket ikke er forsvundet, inden dit barn fylder 5 år, anbefaler vi operation. Vi taler med dig om muligheden for operation. Hvis dit barn skal opereres, foregår det i fuld bedøvelse.

Akut operation

Hvis navlebrokket er stort, kan der opstå en alvorlig tilstand, hvor tarmene sætter sig fast og ikke kan komme tilbage i bughulen. Hvis det sker, er behandlingen en akut operation.

Symptomer på at tarmene har sat sig fast og ikke

kan komme tilbage i bughulen:

- Brokket kan ikke trykkes på plads
- Meget intense smerter
- Misfarvning i området, som tager til.

Hvis dit barn får disse symptomer, skal I kontakte egen læge eller lægevagten.

Kontakt

Organkirurgi
Sygehusvej 24
6000 Kolding
76 36 23 98