

Til patienter og pårørende

Vævsprøve fra blodkar i tindingen

Vævsprøve fra temporalisbiopsi



Øjenafdelingen A630 / A530

I denne pjece vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din operation.

Pjecen indeholder generel information, som ikke kan erstattesamtaler med læger og sygeplejersker i Øjenafdelingen.

Baggrund for operationen

Muskelgigt kan give forandringer i kroppens blodkar. Hvis pulsåren til øjet angribes, kan det medføre varige synsskader. Tilstanden kræver derfor hurtig undersøgelse og behandling.

Formål med operationen

Ved at udtage en vævsprøve fra pulsåren i tindingen og sende den til undersøgelse i mikroskop, kan det afgøres, om der er en betændelsestilstand i pulsårerne.

Du skal have taget en sådan vævsprøve.

Forholdsregler før operationen

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du ikke holde pause, medmindre lægen informerer dig om det.

På operationsdagen

Forløbet på operationsdagen varer ca. 2 - 3 timer.

Inden operationen vil du blive undersøgt af en øjenlæge.

Du skal ikke faste til operationen.

Inden operationen vil du blive tilbudt afslappende og smertestillende medicin.

Operationen

Under operationen ligger du på ryggen. Der er mulighed for at få støtte af forskellige puder.

Lægen vælger den pulsåre, som virker mest betændt.

Tindingen på den valgte side barberes for hår, hvis det skønnes nødvendigt, og pulsåren markeres med en tusch.

Operationen foregår i lokalbedøvelse. Ved hjælp af en tynd kanyler får du sprøjtet lokalbedøvelse ind i huden. Bedøvelsen kan spænde, og nogle synes, at det gør ondt.

Huden renses, og du får en steril afdækning lagt på. Under operationen vil du kunne mærke en berøring af huden.

For at udtage vævsprøven er det nødvendigt at lave et snit i huden. Der kommer et lille ar, der i mange tilfælde dækkes af håret.

Operationen varer ca. 1 time.

Efter operationen

Smerter

Når lokalbedøvelsen aftager, kan der være smerter fra såret. Du må gerne tage smertestillede Paracetamol efter anvisning på pakken.

Forholdsregler

Vi anbefaler, at du holder dig i ro resten af operationsdagen.

Efter 1 døgn må der gerne komme vand på såret.

Fjernelse af tråde

Du skal have fjernet tråde ca. 1 uge efter operationen. Det foregår som regel hos din praktiserende læge.

Svar på prøven

Du får svaret fra prøven fra den afdeling, som skal følge op på din sygdom, oftest en reumatologisk afdeling eller Øjenafdelingen.

Komplikationer

Komplikationer er heldigvis sjældne, og hvis de indtræder, er de ufarlige.

Det kan dreje sig om blodansamling og betændelse i såret.

Hvis du oplever større hævelse, rødme og stærke smerter over operationsstedet, skal du tage kontakt til Øjenafdelingen.

Sådan kommer du i kontakt med os

Hverdage kl. 8 - 15:
Telefon 7940 6450

Hvis du får akut brug for hjælp efter kl. 15 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:
Telefon 7940 5000

På hverdage efter kl. 15 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense universitetshospital.

Hvis du har brug for mere viden, kan følgende netadresser måske bruges:

Øjenafdelingen, Vejle Sygehus
www.sygehuslillebaelt.dk/wm257732

Patienthåndbogen
www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

Værn om Synet
www.vos.dk

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4 . 7100 Vejle
Tlf. 7940 6450
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk