

Risankizumab

Behandling med Skyrizi®

Du skal have medicinen risankizumab mod kronisk betændelse i mave-tarmkanalen (Crohns sygdom). Risankizumab kan holde sygdommen i ro, fordi betændelsen i tarmen bliver dæmpet, men helbreder ikke tarmsygdommen.

Du kan forvente en begyndende effekt af behandlingen efter få uger, men vi vurderer først den endelige effekt efter 3-6 måneder.

Sådan foregår behandlingen

De første 3 gange bliver du indkaldt til behandling i Medicinsk Ambulatorium. Her får du risankizumab som drop direkte i en blodåre. Hver behandling tager cirka 1,5 time, hvor vi holder øje med, om du har det godt.

Efter de 3 første behandlinger hos os skal du lære selv at indsprøjte medicinen derhjemme – enten i låret eller i maven. Vi viser dig, hvordan du gør, og du skal ikke være bange for at stille spørgsmål.

Bivirkninger

Risankizumab kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- træthed
- infektioner i øvre luftveje
- rødme og kløe ved indstiksstedet
- svampeinfektioner i hud /negle
- hovedpine
- hudkløe

De fleste bivirkninger er milde til moderate, men nogle kan opleve alvorlige bivirkninger, som kan være nødvendige at behandle.

Hvis du oplever bivirkninger, kan du ringe til os på 79 40 63 45 mellem kl. 10.30 og 12.00. Der er flest opkald i starten af telefontiden, så hvis der er kø, anbefaler vi, at du prøver senere.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du får risankizumab.

Opbevaring

Du skal som udgangspunkt opbevare injektionspen-
nen i køleskabet (2-8 °C), men undgå frost. Uden
for køleskab er holdbarheden op til 24 timer ved
temperaturer på maksimum 25 °C. Opbevar injekti-
onspennen i den ydre æske for at beskytte mod lys.

Blodprøver

I starten skal du have taget blodprøver lidt hyppi-
gere. Herefter skal du kun have taget blodprøve
hvert halve år. Det taler vi med dig om.

Du skal selv bestille tid til blodprøverne på

www.booking.rsyd.dk

Vi kontakter dig, hvis der er noget unormalt i dine
blodprøver.

Afføringsprøver

Du skal aflevere en afføringsprøve hvert halve år,
som en del af kontrollen af behandlingens effekt.
Du får udleveret prøveglas og vejledning.

Medicinsk Afdeling

Vaccinationer

Du kan have lettere ved at få infektioner, når du får risankizumab. Derfor anbefaler vi, at du bliver vaccineret mod influenza 1 gang om året.

Vi anbefaler og tilbyder desuden, at du bliver vaccineret mod pneumokokker, når du starter behandlingen med risankizumab (medmindre du allerede er vaccineret).

Under behandlingen med risankizumab må du ikke blive vaccineret med vacciner, der indeholder levende svækket virus eller bakterier. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på

min.medicin.dk

Søg på 'Risankizumab'.

Kontakt

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
Gastroenterologisk Ambulatorium (A740)
Beriderbakken 4
7100 Vejle
79 40 63 45

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus
Ambulatorium for Mave-Tarmsygdomme
Sygehusvej 24
6000 Kolding
76 36 33 05
