

Oxycodon (hydrochlorid-kapsler)

Behandling med Oxynorm®

Du skal have medicinen oxycodon mod stærke smerter. Medicinen hører til morfingruppen.

Sådan tager du medicinen

Du får medicinen som kapsler. Du skal synke kapslerne hele med et glas vand.

Du kan forvente at mærke den fulde virkning i løbet af 1 time. Medicinen stopper med at virke efter cirka 6 timer.

Bivirkninger

Oxycodon kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- forstoppelse
- kvalme og opkastning
- tørhed i munden
- træthed
- svimmelhed
- besvær med at tisse
- forvirring
- kløe eller udslæt på huden.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager stærk smertestillende medicin.

Medicinen har rød advarselstrekant

Medicinen er mærket med den røde advarselstrekant. Det betyder, at medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner.

Du må ikke køre bil, når du tager oxycodon-kapsler. Der kan dog være individuelle forskelle, og derfor bør du altid tale med din egen læge om det. Du må under ingen omstændigheder køre erhvervs-kørsel med passagerer, så længe du får morfin.

Alkohol

Hvis du drikker alkohol, forstærker det medicinens sløvende effekt.

Trap ud af medicinen

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist, da man kan få abstinenser ved ophør. Abstinenser kan fx være:

- hjertebanken
- uro i kroppen
- besvær med at sove.

Tag et afføringsmiddel forebyggende

Medicinen giver forstoppelse. Derfor er det ofte nødvendigt at tage et afføringsmiddel fast hver dag, så længe du får medicinen.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Rygcenter Syddanmark

Kontakt

Rygcenter Syddanmark

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Rygmedicinsk Ambulatorium

76 36 13 00

Rygkirurgisk Ambulatorium

76 36 14 00
