

## Rygcenter Syddanmark

# Ibuprofen

## Behandling med fx Ibumetin® eller Ipren®

Du skal have medicinen ibuprofen mod smerter. Medicinen nedsætter også feber.

Kontakt din læge, hvis du oplever dette.

## Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Vi anbefaler, at du tager tabletterne til et måltid for at mindske risikoen for at få ondt i maven.

Medicinen virker efter cirka 30 minutter og stopper med at virke efter 6-8 timer.

### Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på [min.medicin.dk](http://min.medicin.dk)

## Bivirkninger

Ibuprofen kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- smerter i maven
- brændende og sviende fornemmelse i spiserøret
- diarré
- hård mave
- øget ophobning af væske i kroppen.

### Kontakt

Rygcenter Syddanmark  
Sygehusvej 24  
6000 Kolding  
Rygmedicinsk Ambulatorium  
76 36 13 00  
Rygkirurgisk Ambulatorium  
76 36 14 00

## Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager ibuprofen.

### Tag ikke medicinen i længere tid

Du bør ikke tage medicinen i mere 1-2 uger, medmindre du har aftalt andet med din egen læge.

### Smerter i maven

Hvis du oplever smerter i maven, kan du få medicin, der mindsker ubehaget.