

Organkirurgi

Lyskebrok hos børn

Når et barn har lyskebrok, trænger bughinden og en gang imellem også en del af tarmen gennem bugvæggen. Det kan give gener, og derfor kan det være nødvendigt med operation.

Hvis dit barn får disse symptomer, skal I kontakte jeres egen læge eller lægevagten.

Lyskebrok hos drenge og piger

Brokket kan både hos drenge og piger vise sig som en udposning i lysken eller øverst på låret. Hos nogle drenge kan brokket desuden ses i pungen, og hos nogle piger i skamlæben.

Kontakt

Organkirurgi
Sygehusvej 24
6000 Kolding
76 36 23 98

Symptomer

De fleste lyskebrok giver kun få gener i starten. De mest almindelige symptomer er ubehag og lette smerter, især ved hoste og bevægelse.

Operation

Som regel er det muligt at trykke et mindre brok på plads, men med tiden vil de fleste brok vokse. Brokket forsvinder ikke af sig selv og skal derfor opereres. Dit barn bliver opereret i fuld bedøvelse.

Risikoen ved et brok er, at en mindre del af tarmen kan komme i klemme, så brokket kan give tarmslyng. Det er en sjælden, men alvorlig tilstand, som kræver akut operation.

Symptomer på tarmslyng:

- Brokket kan ikke trykkes på plads
- Vedvarende stærke smerter
- Misfarvning i området, som tager til.