

## Kodein

Du skal have medicinen kodein mod smerter.

### Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Medicinen virker i løbet af cirka 30 minutter og stopper med at virke efter 3-6 timer.

### Bivirkninger

Kodein kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- døsighed
- svimmelhed
- kvalme og opkastning
- forstoppelse.

### Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager stærk smertestillende medicin.

#### **Medicinen har rød advarselstrekant**

Medicinen er mærket med den røde advarselstrekant. Det betyder, at medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner.

Du må ikke køre bil, når du tager kodein. Der kan dog være individuelle forskelle, og derfor bør du altid tale med din egen læge om det.

Du må under ingen omstændigheder køre erhvervs-kørsel med passagerer, så længe du tager kodein.

### **Trap ud af medicinen**

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist, da man kan få abstinenser ved ophør. Abstinenser kan fx være:

- hjertebanken
- uro i kroppen
- besvær med at sove.

### **Tag et afføringsmiddel forebyggende**

Medicinen giver forstoppelse. Derfor er det ofte nødvendigt at tage et afføringsmiddel fast hver dag, så længe du får medicinen.

### **Mere viden**

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på [min.medicin.dk](http://min.medicin.dk)

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

---

### **Kontakt**

Rygcenter Syddanmark  
Sygehusvej 24  
6000 Kolding  
Rygmedicinsk Ambulatorium  
76 36 13 00  
Rygkirurgisk Ambulatorium  
76 36 14 00

---