

Behandling af brækket næse

Du er blevet undersøgt på Skadestuen, og vi har mistanke om, at du har brækket din næse. Du skal derfor undersøges af en praktiserende øre-, næse- og halslæge eller i Øre-, Næse- og Halsambulatoriet på Vejle Sygehus. Ved undersøgelsen vurderer vi, om du har brug for en operation.

Du skal selv ringe og bestille tid hos enten:

- en praktiserende øre-, næse- og halslæge
- Øre-, Næse- og Halsambulatoriet på Vejle Sygehus på 79 40 59 80.

Du skal vente 2-5 dage med at ringe, så næsen ikke er lige så hævet.

Det kan du forvente

Det er normalt at have smerter i og omkring næsen i forbindelse med et slag og et eventuelt brud på næsen. Hvis du har smerter, anbefaler vi, at du tager smertestillende medicin med paracetamol (fx Panodil, Pinex eller Pamol) eller ibuprofen (fx Ibumetin eller Ipren). Læs vejledningen til dosis på pakken.

Sådan forbereder du dig

Den dag du kommer til undersøgelse, finder vi ud af, om du har brækket næsen. Som regel kan behandlingen foregå i lokalbedøvelse, men vi beder dig møde fastende, hvis du skal fuldt bedøves.

Faste

Du skal faste før undersøgelsen. Det betyder:

- 6 timer før undersøgelsen skal du stoppe med at spise al mad, mælkeprodukter, juice med frugtkød og smoothie. Drik heller ikke mælk i din

kaffe/te.

- 2 timer før undersøgelsen skal du stoppe med at drikke alle væsker. Vi anbefaler, at det sidste, du drikker, indeholder sukker. Det kan gøre, at du har det bedre efter en eventuel operation.

Hvis du har mad eller væske i maven, når du er bedøvet, kan det glide op af mavesækken og ned i lungerne, fordi alle muskler slapper af. Det kan give alvorlige komplikationer. Hvis du ikke har fastet, og du skal opereres i fuld bedøvelse, bliver din operation udsat eller aflyst.

Kontakt

Ortopædkirurgisk Afdeling

Beriderbakken 4

7100 Vejle

Skadestuen

79 40 61 10

Øre-, Næse- og Halsambulatorium

79 40 59 80 (hverdag kl. 8-15)
