

Om behandling med prednisolon



Prednisolon er et lægemiddel, der ligner kroppens eget binyrebarkhormon, som bliver produceret i binyrerne.

Prednisolon bliver brugt til behandling af flere sygdomme, som f.eks. lungesygdomme, bindevævs-sygdomme og autoimmunsygdomme.

Sådan tager du prednisolon

Tabletterne skal du tage om morgenen sammen med morgenmaden eller et glas mælk. Antallet af tabletter og perioden du skal tage tabletterne i, kan variere.

Det kan være nødvendigt at ændre antallet af tabletter, enten fordi virkningen ikke er god nok eller på grund af bivirkninger.

Bivirkninger

Ved små doser - under 10 mg dagligt - er bivirkningerne forholdsvis små. Ved langvarig behandling med større doser kan du opleve at tage på i vægt

og måske få et såkaldt "måneansigt". Din hud kan blive tynd og tør, og du kan få tendens til blå mærker. Du kan også opleve psykiske ændringer med humørsvingninger og opstemthed. Bivirkningerne forsvinder efterhånden som doseringen bliver mindre.

Kontrol

Behandling med prednisolon kræver jævnlig blodprøvekontrol, så den mest optimale dosering kan findes.

Du kan bruge skemaet nedenfor, så du kan se, hvordan du skal tage dine prednisolon-tabletter

Dosering og tidsrum

Vi har givet dig en plan for, hvornår og hvor ofte du skal tage tabletterne.

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til din behandling med prednisolon.

Kontakt

Medicinsk Afdeling
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Lungemedicinsk Ambulatorium
79 40 63 51 (hverdag kl. 8.00-15.00)
