

Paracetamol (depottabletter)

Behandling med Pinex® Retard

Du skal have medicinen paracetamol som depottabletter mod smerter. Depottabletter frigiver medicinen langsomt, så virkningen varer længere tid. Medicinen nedsætter også feber.

Sådan tager du medicinen

Du får medicinen som tabletter, som du skal synke hele med et glas vand. Du må ikke knuse eller tygge tabletterne.

Dosis er typisk 2-4 tabletter 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Du må højst tage 8 tabletter dagligt.

Du kan forvente at mærke det fulde virkning i løbet af 5 timer.

Bivirkninger

Behandling med paracetamol er som regel uden bivirkninger, hvis du ikke overskrider dosis.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager medicin med paracetamol.

Tag ikke medicinen som ekstra medicin

Tabletterne er ikke egnede som ekstra medicin, hvis du har flere smerter en dag. Overdosis forbedrer ikke virkningen og kan give skader på leveren.

Undgå anden medicin med paracetamol

Du må ikke tage andre typer smertestillende medicin med paracetamol (fx Pinex®, Pamol® eller Panodil®) på samme tid.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00