

# Oxazepam før MR-scanning

## Behandling med fx Oxazepam eller Oxabenz®

Du skal have medicinen oxazepam mod angst eller uro før en MR-scanning på sygehuset.

## Sådan tager du medicinen

Du får medicinen som en tablet, som du skal tage med et glas vand. Tag tableten 1-1,5 time før, at du ønsker virkningen.

Medicinen virker for de fleste i løbet af 1 time.

## Bivirkninger

Oxazepam kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- døsighed og en sløvende effekt
- kvalme
- tørhed i munden
- lavt blodtryk
- forvirring.

## Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager oxazepam.

### Medicinen har rød advarselstrekant

Medicinen er mærket med den røde advarselstrekant. Det betyder, at medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner.

Du må ikke køre bil samme dag, som du har taget medicinen.

### Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på

[min.medicin.dk](http://min.medicin.dk)

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på

[www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

### Kontakt

Rygcenter Syddanmark

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Rygmedicinsk Ambulatorium

76 36 13 00

Rygkirurgisk Ambulatorium

76 36 14 00