

# Pregabalin

## Behandling med fx Lyrica®

Du skal have medicinen pregabalin mod nervesmerter. Pregabalin kan i andre tilfælde bruges mod epilepsi.

## Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Medicinen virker i løbet af cirka 1 time og stopper med at virke efter cirka 6-12 timer.

## Bivirkninger

Pregabalin kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- mavegener (fx diarré og forstoppelse)
- træt- og svimmelhed
- hovedpine
- tørhed i munden
- ondt i halsen
- besvær med at huske
- forvirring
- følelsesmæssige udsving
- smerter i muskler og led
- øget vægt
- problemer med rejsning.

## Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager pregabalin.

### **Medicinen har rød advarselstrekant**

Medicinen er mærket med den røde advarselstrekant. Det betyder, at medicinen sløver og kan på-

virke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner. Når du tager pregabalin, må du kun køre bil, hvis du vurderer, at du kan køre forsvarligt. Du skal være særligt opmærksom, når du starter din behandling, og hvis du øger din dosis.

Hvis du har kørekort til gruppe 2 (fx lastbil eller bus), eller dit arbejde er erhvervskørsel med passagerer, skal du være ekstra opmærksom på, om du kan køre forsvarligt.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

### **Alkohol**

Hvis du drikker alkohol, forstærker det medicinens sløvende effekt.

### **Pregabalin kan påvirke humøret**

Har du tidligere haft en depression eller psykose, kan medicinen påvirke dit humør negativt. Hvis du oplever dette, skal du ringe til din egen læge.

### **Trap ud af medicinen**

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist, da man kan få abstinenser ved ophør. Abstinenser kan fx være:

- hjertebanken
- uro i kroppen
- besvær med at sove.

### **Trap ud af medicinen**

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist over minimum 1 uge, da man kan få abstinenser ved ophør.

---

## Rygcenter Syddanmark

### Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på

[min.medicin.dk](http://min.medicin.dk)

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på

[www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

---

### Kontakt

Rygcenter Syddanmark

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Rygmedicinsk Ambulatorium

76 36 13 00

Rygkirurgisk Ambulatorium

76 36 14 00

---