

# Paracetamol

Behandling med fx Panodil®, Pamol® eller Pinex®

Du skal have paracetamol mod smerter. Medicinen nedsætter også feber.

## Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand.  
Tag 2 tabletter med mindst 4 timers mellemrum.  
Du må højst tage 8 tabletter i døgnet.

Medicinen virker i løbet af 30-60 minutter og stopper med at virke efter 5-6 timer.

## Bivirkninger

Behandling med paracetamol er som regel uden bivirkninger, hvis du ikke overskrider dosis.

## Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager paracetamol.

### **Tag ikke for mange tabletter**

Overdosis forbedrer ikke virkningen og kan give skader på leveren.

### **Undgå anden medicin med paracetamol**

Du må ikke tage andre typer smertestillende medicin med paracetamol (fx Pinex, Pamol eller Panodil) på samme tid.

### **Mere viden**

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på [min.medicin.dk](http://min.medicin.dk)

---

### **Kontakt**

Rygcenter Syddanmark  
Sygehusvej 24  
6000 Kolding  
Rygmedicinsk Ambulatorium  
76 36 13 00  
Rygkirurgisk Ambulatorium  
76 36 14 00

---