

Leukeran

Information om din medicin

Denne information er skrevet for at besvare nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du skal begynde din behandling med Leukeran. Leukeran er en tablet, som er en form for kemoterapi, der indeholder det aktive stof chlorambucil.

Sådan virker Leukeran

Leukeran er et lægemiddel, der bliver brugt til at behandle visse typer af kræft. Det hjælper med at stoppe kræftcellerne i at vokse og sprede sig i kroppen. Leukeran bliver brugt til behandling af blandt andet leukæmi og lymfekræft.

Sådan tager du Leukeran

Du skal tage Leukeran på følgende måde:

- Du skal synke tabletterne hele med et glas vand til.
- Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.
- Du skal tage tabletterne på tom mave mindst 1 time før eller 3 timer efter et måltid.
- Det kan være en fordel, hvis du tager tabletterne om aftenen. På den måde kan du sove dig fra den kvalme, du kan få af behandlingen.
- Du skal opbevare Leukeran i køleskabet.

Følg lægens anvisning om dosis

Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvor længe du skal tage dem. Det er vigtigt, at du følger lægens anvisninger og ikke ændrer i doseringen uden at tale med lægen først.

Hvis hjemmeplejen doserer din medicin

Hvis hjemmeplejen doserer din øvrige medicin, er

det yderst vigtigt, at du tager Leukeran-tabletterne direkte fra glasset i køleskabet ved hver dosis. Tabletterne må ikke doseres i en doseringsæske.

Bivirkninger ved Leukeran

Der er bivirkninger ved Leukeran, som kan variere fra person til person. Nogle bivirkninger kræver, at du ringer til os hurtigst muligt.

Reager på disse symptomer

Du skal ringe til os, hvis:

- du får feber på 38,3 °C eller derover
- du får blødninger i huden eller fra slimhinder
- der sker ændring/forværring i din tilstand.

Infektion

Dit immunforsvar kan blive svækket, og du kan få større risiko for infektion i form af feber, luftvejsinfektioner og blærebetændelse. Det skyldes, at antallet af de hvide blodlegemer nedsættes på grund af din sygdom. De hvide blodlegemer er vigtige for kroppens forsvar mod infektioner.

Blødning

Leukeran kan få antallet af blodplader til at falde. Blodpladerne er med til at standse blødninger. Symptomer kan være:

- mange blå mærker
- blødning fra slimhinden i næse og mund
- blod i afføring eller urin.

Blodmangel

Leukeran kan få antallet af de røde blodlegemer til at falde. Symptomer kan være:

- åndenød

Medicinsk Afdeling

- hjertebanken
- svimmelhed.

Andre almindelige bivirkninger

Andre almindelige bivirkninger til Leukeran kan være:

- kvalme og opkastning
- diarré
- tab af appetit
- træthed.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til bivirkninger eller din behandling, er du altid velkommen til at ringe til os, så vi kan hjælpe dig.

Kontakt

Medicinsk Afdeling
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Hæmatologisk Ambulatorium
79 40 63 35 (hverdage kl. 08.20-16.15)
Hæmatologisk Sengeafsnit
79 40 69 48 (uden for ambulatoriets åbningstider)
