

Rygcenter Syddanmark

Klorzoxazon

Du skal have medicinen klorzoxazon mod smerter og spændinger i dine muskler. Medicinen får musklerne til at slappe af.

Sådan tager du medicinen

Du får medicinen som tabletter, som du skal tage med et glas vand. Medicinen virker i løbet af 1 time.

Bivirkninger

Klorzoxazon kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- træthed
- svimmelhed.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager klorzoxazon.

Medicinen har rød advarselstrekant

Medicinen er mærket med en rød advarselstrekant. Det betyder, at medicinen sløver og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner.

Når du tager klorzoxazon, må du kun køre bil, hvis du vurderer, at du kan køre forsvarligt.

Hvis du har kørekort til gruppe 2 (fx lastbil eller bus), eller dit arbejde er erhvervskørsel med passagerer, skal du være ekstra opmærksom på, om du kan køre forsvarligt.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Rygmedicinsk Ambulatorium

76 36 13 00

Rygkirurgisk Ambulatorium

76 36 14 00