

Mirikizumab

Behandling med Omvoh®

Du skal have medicinen mirikizumab mod kronisk betændelse i tyktarmen (colitis ulcerosa). Mirikizumab kan holde sygdommen i ro, fordi betændelsen i tarmen bliver dæmpet, men helbreder ikke tarmsygdommen.

Du kan forvente en begyndende effekt af behandlingen efter få uger, men vi vurderer først den endelige effekt efter 3-6 måneder.

Sådan foregår behandlingen

De første 3 gange bliver du indkaldt til behandling i Medicinsk Ambulatorium. Her får du mirikizumab som drop direkte i en blodåre. Hver behandling tager cirka 1 time, hvor vi holder øje med, om du har det godt.

Efter de 3 første behandlinger hos os skal du lære selv at indsprøjte medicinen derhjemme – enten i låret eller i maven. Det kan også være på bagsiden af overarmen, hvis du har en anden person til at gøre det derhjemme. Vi viser dig, hvordan du gør, og du skal ikke være bange for at stille spørgsmål.

Bivirkninger

Mirikizumab kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- infektioner i øvre luftveje
- ledsmerter
- hovedpine
- udslæt i huden
- rødme og kløe ved indstiksstedet.

Alvorlige og sjældne bivirkninger er:

- helvedesild.

De fleste bivirkninger er milde til moderate, men nogle kan opleve alvorlige bivirkninger, som kan være nødvendige at behandle.

Hvis du oplever bivirkninger, kan du ringe til os på 79 40 63 45 mellem kl. 10.30 og 12.00. Der er flest opkald i starten af telefontiden, så hvis der er kø, anbefaler vi, at du prøver senere.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager mirikizumab.

Opbevaring

Du skal som udgangspunkt opbevare injektionspennene i køleskabet (2-8 °C), men undgå frost. Uden for køleskab er holdbarheden op til 2 uger ved temperaturer på maksimum 30 °C. Opbevar injektionspennene i den ydre æske for at beskytte dem mod lys.

Blodprøver

I starten skal du have taget blodprøver lidt hyppigere. Herefter skal du kun have taget blodprøve hvert halve år. Det taler vi med dig om.

Du skal selv bestille tid til blodprøverne på www.booking.rsyd.dk

Vi kontakter dig, hvis der er noget unormalt i dine blodprøver.

Medicinsk Afdeling

Afføringsprøver

Du skal aflevere en afføringsprøve hvert halve år, som en del af kontrollen af behandlingens effekt. Du får udleveret prøveglas og vejledning.

Vaccinationer

Du kan have lettere ved at få infektioner, når du får mirikizumab. Derfor anbefaler vi, at du bliver vaccineret mod influenza 1 gang om året.

Vi anbefaler og tilbyder desuden, at du bliver vaccineret mod pneumokokker, når du starter behandlingen med mirikizumab (medmindre du allerede er vaccineret).

Under behandlingen med mirikizumab må du ikke blive vaccineret med vaccine, der indeholder levende svækket virus eller bakterier. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk
Søg på 'Mirikizumab'.

Kontakt

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
Gastroenterologisk Ambulatorium (A740)
Beriderbakken 4
7100 Vejle
79 40 63 45

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus
Ambulatorium for Mave-Tarmsygdomme
Sygehusvej 24
6000 Kolding
76 36 33 05
