

Morfin

Behandling med hurtigtvirkende tabletter

Du skal have morfin-tabletter mod stærke smerter.

Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Medicinen virker i løbet af cirka 30 minutter og stopper med at virke efter cirka 6 timer.

Bivirkninger

Medicin kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- hård mave
- kvalme og opkastning
- tørhed i munden
- træthed
- svimmelhed
- kløe eller udslæt på huden.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager stærk smertestillende medicin.

Medicinen har rød advarselstrekant

Medicinen er mærket med en rød advarselstrekant. Det betyder, at medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner.

Du må ikke køre bil, når du tager hurtigtvirkende morfin. Der kan dog være individuelle forskelle, og derfor bør du altid tale med din egen læge om det. Du må under ingen omstændigheder køre erhvervs-kørsel med passagerer, så længe du får morfin.

Alkohol

Hvis du drikker alkohol, forstærker det medicinens sløvende effekt.

Trap ud af medicinen

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist, da man kan få abstinenser ved ophør. Abstinenser kan fx være:

- hjertebanken
- uro i kroppen
- besvær med at sove.

Tag et afføringsmiddel forebyggende

Medicinen giver forstoppelse. Derfor er det ofte nødvendigt at tage et afføringsmiddel fast hver dag, så længe du får medicinen.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00