

Liraglutid

Behandling med Victoza®

Du skal have medicinen liraglutid mod galdesyrearré, fordi ændring af din kost og behandling med Questran® (pulver) eller Cholestagel® (tabletter) ikke har virket tilstrækkeligt.

Liraglutid hjælper med at regulere tarmens væskebalance, så du mister mindre væske.

Du skal som udgangspunkt blive ved med at tage medicinen for at modvirke diarréen.

Sådan virker medicinen

Kronisk diarré kan påvirke tarmens væskebalance, så den har sværere ved at optage væske og næring.

Liraglutid gør tarmens bevægelser langsommere, så den bedre kan optage væske og næring.

Sådan tager du medicinen

Du skal sprøjte liraglutid ind i underhuden 1 gang om dagen. Det gør du med en pen, der har en tynd kanyle. Vi lærer dig, hvordan du bruger pennen.

Startdosis er 0,6 mg, som kan øges til 1,2 mg og derefter 1,8 mg, hvis startdosis ikke har nogen virkning.

Vi fortæller dig, hvordan og hvornår du eventuelt skal øge din dosis.

Kom medicinen på køl

Du skal opbevare ubrugte penne i køleskabet for ikke at ødelægge medicinens virkning.

Bivirkninger

Medicinen kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger ved liraglutid er:

- kvalme
- vægttab.

Kvalme og vægttab skyldes, at medicinen får mavesækken til at tømme sig langsommere. Hos de fleste går kvalmen over igen.

Hvis du har mange bivirkninger, kan vi vente med at øge din dosis. Det aftaler du med sygeplejersken i ambulatoriet.

Det videre forløb

Du har opfølgende aftaler, som er vigtige for, at vi kan følge dig og sikre dig det bedste resultat. Skriv gerne eventuelle spørgsmål ned på forhånd, så du er forberedt.

Fortæl os, om medicinen virker

Når du har brugt al medicinen i den første pen, skal du kontakte os og fortælle én af vores sygeplejersker, om behandlingen hjælper.

Se i kontaktoplysningerne, hvornår du kan tale med en sygeplejerske.

Hvis medicinen virker, får du en recept, og lægen søger tilskud til behandlingen.

Du kan så hente medicinen og en boks til brugte nåle på apoteket.

Medicinsk Afdeling

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk ved at søge på 'liraglutid' og 'Victoza'.

Her kan du også se en video om, hvordan du tager medicinen korrekt.

Kontakt

Vejle Sygehus

Medicinsk Afdeling

Gastroenterologisk Ambulatorium

79 40 63 45

Sekretærer træffes hverdage mellem kl. 8-15

Sygeplejersker træffes hverdage mellem kl. 10.30-12.30

Kolding Sygehus

Medicinske Sygdomme

Mave-Tarmsygdomme

76 36 33 05

Sekretærer træffes hverdage mellem kl. 8-15

Sygeplejersker træffes hverdage mellem kl. 8.15-9.00 og mellem kl. 12.00-13.30