

Sædprøve efter sterilisation

Patientvejledning

3 måneder efter sterilisering (vasektomi) skal det kontrolleres, at der ingen sædceller er i en sædprøve.

Remedier

Du har fået udleveret en prøvekuvert indeholdende:

- 1 plastbeholder med låg
- 1 absorberende dug/lomme
- 1 forseglet plastikpose
- 1 adresseret, frankeret kuvert.

Sådan gør du

I perioden siden sterilisationen skal der være sket mindst 20 sædudtømmelser. Når prøven opsamles, skal der være gået mindst 3 dage siden sidste sædudtømmelse.

Tøm urinblæren før prøvetagning. Afvask penis med tilbagetrukket forhud. Brug lunkent vand, og undgå brug af sæbe.

Ved masturbation tømmes sæden direkte ned i plastbeholderen. Forsøg at få hele mængden med. Sæt låget godt fast på plastbeholderen, læg den i den absorberende dug/lomme og derefter i plastposen. Læg plastposen og følgesedlen i kuerten.

Prøve og følgeseddel skal afleveres mandag til torsdag (senest 1 døgn efter sædudtømmelsen) i Blodprøver og EKG på Kolding Sygehus, Fredericia Sundhedscenter, Middelfart Sygehus eller Vejle Sygehus.

Alternativt kan prøve og følgeseddel sendes fra pakeshop/postbutik samme dag som sædudtømmelsen, dog kun mandag og tirsdag. Det er vigtigt, at prøven sendes med den hurtigste leveringsmulighed, da prøven kun er holdbar i 3 døgn.

Svar på undersøgelsen

Resultatet af sædprøven bliver sendt til den afdeling eller læge, der har bestilt undersøgelsen.

Yderligere information

Du er altid velkommen til at kontakte Blodprøver og EKG (Kolding Sygehus), hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Biokemi og Immunologi
Beriderbakken 4
7100 Vejle
76 36 30 32 (mandag til torsdag kl. 7-15 og fredag kl. 7-14)
