

Amitriptylin

Behandling med fx Amitriptylin eller Saroten®

Du skal have medicinen amitriptylin mod nerve-smerter. Amitriptylin kan i andre tilfælde bruges mod depression.

Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen hver aften med et glas vand. For nogle kan der gå op til 1 uge, før man mærker den fulde virkning.

Bivirkninger

Amitriptylin kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- træthed
- tørhed i munden
- forstoppelse
- besvær med at tisse
- sløret syn
- rysten.

En sjælden bivirkning ved amitriptylin er forstyrrelser af hjerterytmen. Hvis du mærker dette, skal du kontakte din egen læge.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager amitriptylin.

Bilkørsel

Medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken og betjene maskiner.

Når du tager amitriptylin, må du kun køre bil, hvis du vurderer, at du kan køre forsvarligt. Du skal være særligt opmærksom, når du starter din behandling, og hvis du øger din dosis. Hvis du har kørekort til gruppe 2 (fx lastbil eller bus), eller dit arbejde er erhvervskørsel med passagerer, skal du være ekstra opmærksom på, om du kan køre forsvarligt.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Tag ikke medicinen som ekstra medicin

Amitriptylin er lang tid om at virke, så derfor er medicinen ikke egnet til at bruge som ekstra medicin, hvis du nogle dage har flere smerter.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00
