

Rygcenter Syddanmark

Paracetamol

Panodil® 665 mg med modificeret udløsning

Du skal have medicinen Panodil® 665 mg med modificeret udløsning mod smerter.

Modificeret udløsning betyder, at medicinen optages langsommere end almindelig paracetamol og derfor virker i længere tid. Det betyder også, at du skal tage færre piller. Medicinen nedsætter også feber.

Sådan tager du medicinen

Du får medicinen som tabletter, som du skal synke hele med et glas vand. Tabletterne må ikke knuses.

Medicinen virker i løbet af 30-60 minutter og stopper med at virke efter cirka 8 timer.

Du må højst tage 6 tabletter i døgnet.

Bivirkninger

Behandling med paracetamol er som regel uden bivirkninger, hvis du ikke overskrider dosis.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager paracetamol.

Tag ikke for mange tabletter

Over 6 tabletter i døgnet forbedrer ikke virkningen og kan give skader på leveren.

Undgå anden medicin med paracetamol

Du må ikke tage andre typer smertestillende medicin med paracetamol (fx Pinex®, Pamol® eller Panodil®) på samme tid.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00