

Magnesia

Du skal have medicinen Magnesia, som er et afføringsmiddel. Medicinen virker ved at øge indholdet af væske i tarmen.

Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Medicinen virker efter 6-8 timer.

Bivirkninger

Magnesia kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- diarré
- smerter i maven
- luft i maven
- kvalme og opkastning
- hovedpine.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager magnesia.

Drik rigeligt med vand, og bevæg dig

Når du tager et afføringsmiddel, er det vigtigt, at du drikker rigeligt med væske. Du skal også sørge for at bevæge dig for at stimulere tarmens bevægelser.

Tag jern og Magnesia forskudt

Hvis du tager et tilskud af jern, skal du sørge for, at der går 2 timer mellem, at du tager jern og Magnesia.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00