

Til patienter og pårørende

Fotografisk undersøgelse af nethinden

Fluorescein-angiografi



Øjenafdelingen A610 / A630

Baggrund for undersøgelsen

Ved en række øjensygdomme opstår der forandringer på øjets nethinde. Nethinden er det inderste lag i øjet, og den indeholder øjets synsceller. Ved at fotografere nethinden kan det afklares, hvilke eventuelle forandringer der er på nethinden, og hvordan de eventuelt kan behandles.

Hvordan foregår undersøgelsen?

For at kunne fotografere nethinden skal pupillerne være store. Derfor drypper vi dine øjne med øjendråber, som udvider pupillerne. Dråberne virker efter ca. 20 minutter. Sygeplejersken lægger en plastikkanyle i en blodåre i armen eller i håndryggen. Vi fjerner kanylen igen 20 minutter efter, at undersøgelsen er afsluttet.

Under selve undersøgelsen sidder du i en stol foran et kamera med hagen og panden støttet. Når undersøgelsen starter, får du sprøjtet et farvestof ind i blodåren via plastikkanylen. Efter få sekunder når farvestoffet frem til øjets nethinde, og fotograferingen begynder.

Er der ubehag ved undersøgelsen?

At få lagt en kanyle i armen, er som at få taget en blodprøve.

Når vi sprøjter farvestoffet ind, oplever nogle få patienter kortvarigt kvalme. Under fotograferingen ses en række kraftige lysglimt. Det er helt uskadeligt, men du vil være blændet nogle minutter efter fotograferingen.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Selve fotograferingen varer 10 - 15 minutter.

Efter fotograferingen ser en øjenlæge på billederne, og du får svar på undersøgelsen af øjenlægen.

Du skal regne med at være i Øjenambulatoriet i 2-3 timer.

Særlige forholdsregler efter undersøgelsen

Øjendråberne, som udvider pupillerne, virker i mindst 4 timer. Du vil mærke, at dit syn er sløret, og at du bliver blændet af skarpt lys.

Du må derfor ikke køre bil i mindst 4 timer efter undersøgelsen. Du må gerne tage offentlig transport.

På grund af farvestoffet, kan din hud blive gullig og din urin blive kraftig gul i op til 1 døgn efter undersøgelsen. Vi anbefaler, at du drikker rigeligt med væske det første døgn efter undersøgelsen.

Hvis du har sukkersyge

Du skal være opmærksom på, at urinstix for sukker kan vise falske værdier i op til et døgn efter undersøgelsen.

Hvis du er gravid

Hvis du er gravid, kan undersøgelsen ikke laves. Du vil blive undersøgt på anden måde.

Hvis du har allergi

Du skal oplyse øjenlægen og sygeplejersken om eventuelle allergier, så øjenlægen kan vurdere, om undersøgelsen kan gennemføres.



Sådan kommer du i kontakt med os:

Hverdage kl. 8 - 15:

Telefon 7940 6450

Hvis du får akut brug for hjælp efter kl. 15 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:

Telefon 7940 5000

På hverdage efter kl. 15 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital.

[illegible]

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4 . 7100 Vejle
Tlf. 7940 5000
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk

A610 / A630

www.sygehuslillebaelt.dk