

Duloxetin

Behandling med Cymbalta®

Du skal have medicinen duloxetin mod nervesmerter.

Sådan tager du medicinen

Du skal tage medicinen med et glas vand. Medicinen virker for de fleste i løbet af cirka 2 uger, men der kan gå op til 2-4 uger, før du har den fulde virkning.

Bivirkninger

Duloxetin kan give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er:

- træt- og døsighed
- hovedpine
- kvalme
- tørhed i munden
- nedsat seksualdrift
- nedsat appetit
- vægttab.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager duloxetin.

Bilkørsel

Medicinen virker sløvende og kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner. Når du tager duloxetin, må du kun køre bil, hvis du vurderer, at du kan køre forsvarligt. Du skal være særligt opmærksom, når du starter din behandling, og hvis du øger din dosis.

Hvis du har kørekort til gruppe 2 (fx lastbil eller bus), eller dit arbejde er erhvervskørsel med passagerer, skal du være ekstra opmærksom på, om du kan køre forsvarligt. Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Duloxetin kan påvirke humøret

Duloxetin er også et middel mod depression og angst. Har du tidligere haft en depression eller psykose, kan medicinen derfor påvirke dit humør negativt. Hvis du oplever dette, skal du ringe til din egen læge.

Trap ud af medicinen

Hvis du skal stoppe med medicinen, anbefaler vi, at det sker gradvist, da man kan få abstinenser ved ophør. Abstinenser kan fx være:

- hjertebanken
- uro i kroppen
- besvær med at sove.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen på min.medicin.dk

Du kan læse mere om trafikfarlig medicin på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Kontakt

Rygcenter Syddanmark
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Rygmedicinsk Ambulatorium
76 36 13 00
Rygkirurgisk Ambulatorium
76 36 14 00