

Til patienter og pårørende

Operation for hudkræft med lukning af øjet



Øjenafdelingen A630 / A530



I denne pjece vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din operation.

Pjecen indeholder generel information, som ikke kan erstatte samtaler med læger og sygeplejersker i Øjenafdelingen.

Baggrunden for operationen

Hudkræft (basalcellulært karcinom) vokser i huden, men spreder sig sjældent til resten af kroppen.

Det er nødvendigt med operation, da hudkræften ellers vil blive ved med at vokse.

Om operationen

Der foretages mindst 2 operationer på samme dag.

Ved første operation fjernes vævet med hudkræft, og det sendes til mikroskopisk undersøgelse. Måske er det nødvendigt at fjerne mere væv afhængigt af svaret på den mikroskopiske undersøgelse.

Når vi modtager et svar om, at alt væv med hudkræft er fjernet, lukkes huden igen. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at tage hud fra det andet øjenlåg til at dække det opererede område med.

I forbindelse med din operation lukkes øjet i en periode på ca. 4 uge for at sikre bedst mulig heling.

Praktiske oplysninger før operationen

Får du blodfortyndende behandling, skal du aftale med øjenlægen, om du skal holde pause op til operationen.

Husk før operationen

Hvis du får information af lægen om at bruge øjensalve efter operationen, kan du hente det på apoteket inden operationen. Ikke alle øjensalver kræver recept.

Hvis du skal smøre med Kloramfenikolsalve, sendes en recept elektronisk til apoteket.

På operationsdagen

Dit forløb på operationsdagen kan vare til efter middag.

Du må ikke have make-up på, når du møder til operation. Mascara skal være omhyggeligt afrenset.

Du skal ikke faste til operationen.

Inden operationen vil du blive tilbudt smertestillende og eventuelt afslappende medicin.

Operationen

Operationen foregår i lokal bedøvelse. Ved hjælp af en tynd kanyler får du sprøjtet lokalbedøvelse ind i huden. Bedøvelsen kan spænde og nogle synes, at det gør ondt.

Under operationerne ligger du på ryggen. Der er mulighed for at få støtte af forskellige puder.

Huden renses, og du får en steril afdækning lagt på. Afdækningen løftes væk fra næse og mund, så den ikke generer vejrtrækningen.

Under operationerne vil du kunne mærke en berøring af huden.

Efter den første operation får du en klap for øjet. Mens vi venter på svaret, er du i venteværelset.

Ved den sidste operation laves en rekonstruktion af huden, og øjenlågene syes sammen.

Efter operationen kan du komme hjem igen.

Forholdsregler

- Vi anbefaler, at du holder dig i ro resten af operationsdagen, og i øvrigt tager den med ro til trådene er fjernet.
- Hovedet bør være lejret højt om natten den første uge.
- Du skal vide, at rygning forsinker sårheling og giver større risiko for infektioner.
- Vent med at gå i svømmehal og bade i havet til 1 uge efter den sidste operation, hvor øjet bliver åbnet igen.
- Du må ikke køre bil, så længe dit øje er lukket.

Gener efter operationen

Du kan opleve følgende gener:

- Lette smerter de første 2 - 3 dage. Smerterne kan afhjælpes med Paracetamol efter anvisning på pakken.
- Huden kan være hævet og misfarvet i 1 uge.
- Irritation og tåreflåd de første 2 uger.

Kontrol

Efter operationen møder du i Øjenambulatoriet, hvor forbindingen fjernes. Du bliver også undersøgt af lægen.

Du skal til kontrol i Øjenambulatoriet ca. 1 uge efter operationen, hvor trådene i huden fjernes.

Alle tråde kan ikke altid fjernes samtidig, så det kan være nødvendigt med flere besøg.

Behandling med øjensalve

Hvis du skal bruge øjensalve efter operationen, vil du få nærmere anvisning på, hvordan du skal bruge øjensalven.

Det er vigtigt at vaske hænderne grundigt, før du bruger øjensalve.

Undgå at trække i øjenlågene.

Rensning af øjenomgivelserne

Det er godt forsigtigt at rense sårene dagligt.

Du kan bruge rent vand vredet op med vand fra vandhannen til at rense sårene med.

Den sidste operation hvor øjet åbnes igen

Efter ca. 4 - 7 uger er øjets slimhinde og huden omkring øjet helet.

Ved en lille operation åbnes dit øje igen. Operationen foregår i lokalbedøvelse.

Risici og komplikationer

Ved følgende symptomer skal du kontakte Øjenafdelingen:

- Tiltagende smerter
- Blødning
- Pus
- Tiltagende rødme

Se kontaktoplysninger på side 10.

Indtast overskrift

Sådan kommer du i kontakt med os

Hverdage kl. 8 - 15:

Telefon 7940 6450

Hvis du får akutbrug for hjælp efter kl. 15 eller i weekenden, kan du ringe til omstillingen:

Telefon 7940 5000.

På hverdag efter kl. 15 vil du blive stillet om til vagthavende øjenlæge på Vejle Sygehus.

I weekenden vil du blive stillet om til Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital.

[illegible]

Vejle Sygehus
Øjenafdelingen
Beriderbakken 4 . 7100 Vejle
Tlf. 7940 6450
oejenafdelingen@rsyd.dk
www.vejlesygehus.dk

A630 / A530