

Tofacitinib

Behandling med Xeljanz

Du skal have medicinen tofacitinib mod kronisk tarmbetændelse i tyktarmen. Tofacitinib virker ved at hæmme betændelsen i tyktarmens slimhinde. kan holde sygdommen i ro, fordi betændelsen i tarmen bliver dæmpet, men medicinen helbreder ikke tarm-sygdommen.

Du kan forvente en effekt af behandlingen efter få uger, men den endelige effekt kan først vurderes efter 2-3 måneder.

Sådan foregår behandlingen

Du får medicinen som tabletter på 5 mg. Synk tabletterne hele med et glas vand. Tabletterne kan også knuses, hvis du har svært ved at synke dem. De kan tages både med og uden mad.

I starten skal du have 10 mg (2 tabletter) 2 gange om dagen i 8 uger.

Herefter skal du tage 5 mg (1 tablet) 2 gange om dagen for at holde sygdommen i ro.

Tag tabletterne på samme tid hver dag.

Tag ikke dobbelt dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen, må du ikke tage dobbelt dosis næste gang. Fortsæt blot med den normale dosis.

Bivirkninger

Medicinen kan give bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger:

- Kvalme
- Diarré
- Smerter i maven
- Fordøjelsesbesvær
- Forhøjet kolesterol-tal
- Uren hud
- Infektion i luftvejene
- Blærebetændelse
- Herpes zoster (helvedesild)
- Blodpropper i benene og lungerne.

Vær opmærksom på

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, når du tager tofacitinib.

Vaccinationer

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret mod:

- herpes zoster (helvedesild)
- pneumokokker (lungebetændelse)
- influenza
- covid

Der er visse vacciner, du ikke må få, når du er i behandling med tofacitinib, fordi medicinen påvirker dig immunsystem. Du må fx ikke få vacciner mod:

- gul feber
- tuberkulose
- mæslinger
- skoldkopper.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Graviditet og amning

Vi fraråder at blive gravid under behandlingen med tofacitinib. Hvis du planlægger at blive gravid, bør du stoppe med tofacitinib 4 uger før, du forsøger at blive gravid. Vi fraråder også amning under behandlingen. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvis du bliver gravid under behandlingen, er det vigtigt, at du kontakter os.

Hvis du er mand, kan du sagtens tage tofacitinib, selvom din partner er gravid, eller I planlægger graviditet.

Bestil tid til blodprøver

Du skal have taget blodprøver 2, 6 og 14 uger efter, du er startet i behandlingen. Herefter skal du fast have taget blodprøver hver 12. uge. Vi fortæller dig, hvornår du skal have taget blodprøverne.

Du skal selv bestille tid til blodprøverne på www.booking.rsyd.dk

Afføringsprøve

Du skal have taget en afføringsprøve hvert halve år. Når du kommer til kontrol hos os, kan du få et prøvesæt til at tage prøven.

Bestil medicinen hjemmefra

Når du er ved at løbe tør for tofacitinib, kan du bestille medicinen via vores hjemmeside:

<https://sygehuslillebaelt.dk/medafdbest>

I formularen til bestilling af medicin kan du se 'Tofacitinib (Xeljanz)'.
(Xeljanz)

Du skal afhente medicinen i Gastroenterologisk Ambulatorium (Vejle Sygehus). Du kan se på hjemmesiden i hvilke tidsrum, du kan afhente medicinen.

Mere viden

Du kan finde flere oplysninger om medicinen ved at søge på 'Tofacitinib' på min.medicin.dk

Kontakt

Medicinsk Afdeling

Beriderbakken 4

7100 Vejle

Gastroenterologisk Ambulatorium

79 40 63 45 (hverdage kl. 8-15)

Medicinske Sygdomme

Sygehusvej 24

6000 Kolding

Mave-Tarmsygdomme, Medicinsk Ambulatorium

76 36 33 05 (hverdage kl. 8-15)